



## Diagnostic d'une thrombopénie induite par l'héparine (TIH), score des 4T

CHV-PRECO-TRA004 v01

Version : 1

Applicable le : 07-06-2022



### À remplir et à joindre au prélèvement pour toute recherche de TIH

<b>N° Sigma :</b> <b>Nom :</b> COLLER ICI <b>Prénom :</b> L'ETIQUETTE <b>Nom de naissance :</b> SIGMA <b>Né(e) le :</b>	<b>Service de soins (UF)</b> COLLER ICI L'ETIQUETTE N° UF -----	<b>HEPARINE INCRIMINEE</b> -----	RESERVE A L'ETIQUETTE CODE BARRE INTERNE BIOLOGIE
---	--	-------------------------------------	--

Le score des 4T permet d'identifier le **niveau de risque** (faible, intermédiaire ou haut) et d'évaluer la **probabilité clinique de TIH** au moment de sa suspicion

Points	2	1	0	Score
<b>Thrombopénie</b>	- Diminution > 50 % de la numération plaquettaire <b>ET</b> Plaquettes nadir ≥ 20 G/L <b>sans</b> chirurgie dans les 3 jours précédents	- Diminution de 30 à 50 % de la numération plaquettaire <b>Ou</b> Plaquettes entre 10 et 19 G/L <b>Ou</b> Diminution > 50 % <b>avec</b> chirurgie dans les 3 jours précédents	- Diminution de moins de 30 % de la numération plaquettaire <b>Ou</b> Plaquettes nadir < 10 G/L	/2
<b>Temps de survenue de la thrombopénie</b>	- Chute de la numération plaquettaire (ou thrombose) 5 à 10 jours après le début de l'héparine - <b>Ou</b> dans un délai de 24H si héparinothérapie récente (5-30 jrs)	- Chute de la numération plaquettaire après plus de 10 jours d'héparine - <b>Ou</b> dans un délai de 24h si héparinothérapie semi récente (31-100 jrs)	- Thrombopénie survenue dans les 4 premiers jours de traitement mais sans exposition à l'héparine dans les 100 jours précédents.	/2
<b>Thrombose ou autres complications</b>	- Nouvelle thrombose (confirmée) - <b>Ou</b> Nécrose cutanée (point d'injection) - <b>Ou</b> Réaction systémique après injection HNF - <b>Ou</b> hémorragie des surrénales	- Extension ou récurrence d'une thrombose préexistante - <b>Ou</b> Suspicion de nouvelle thrombose - <b>Ou</b> érythème cutané après injection d'héparine	- Aucun événement	/2
<b>Autres causes de la thrombopénie</b>	- Aucune autre cause possible de thrombopénie	Autre cause possible de thrombopénie : - Sepsis sans confirmation microbiologique - Thrombopénie associée à une ventilation mécanique - Autres	Autre cause probable : - Chirurgie dans les 72H - Infection confirmée - Chimio ou radiothérapie dans les 20 derniers jours - CIVD due à une autre cause - Purpura post transfusionnel - Plaquettes < 20G/L probablement d'origine médicamenteuse	/2
<b>Total</b>				<b>/8</b>

D'après Linkins et al. Chest 2012

**Probabilité : Forte (score 6 à 8), Moyenne (score 4 à 5), faible (score 0 à 3)**