



Assistance Publique
Hôpitaux de Marseille

Service de Pharmacologie Médicale et Clinique

Pr. Simon

CHU Timone

N° UF Prescripteur

Dosage des anesthésiques

locaux

Etiquette patient

Vous demandez un dosage d'un anesthésique local de type amido-amide suite à un cas d'intoxication aiguë, veuillez suivre le protocole suivant et renseigner les informations demandées.

Protocole

- Réaliser trois prélèvements sanguins sur tube sec (bouchon rouge)
 - Au moment de l'apparition des effets indésirables
 - 1h après
 - 3h après
- Veuillez transmettre ces tubes au laboratoire de Pharmacologie Médicale Pr. Simon, Timone
(les tubes doivent être conservés au réfrigérateur puis transmis ensemble au laboratoire)
- Contact : Dr. R. Guilhaumou 89656/87565

Renseignements nécessaires

Molécule administrée

- Ropivacaine ☐

- Lidocaïne ☐

- autre :

Date : __/__/__

Heure de l'administration : __h__min

Heure de l'apparition de l'effet indésirable : __h__min

Heure du 1^{er} prélèvement (au moment de l'apparition des effets indésirables) : __h__min

Heure du 2^{ème} prélèvement (1h après le 1^{er}) : __h__min

Heure du 3^{ème} prélèvement (3h après le 1^{er}) : __h__min

Nature de l'intervention :

Nature de l'anesthésie :

Posologie administrée :

Description des effets indésirables :

.....

.....